

Doenças e Tratamentos

Associação de Criadores de Cárniros de Niterói - 2006

SINTOMAS	DOENÇAS	REMÉDIOS	DOSAGENS
Sede, emagrecimento, movimentos trôpegos, diarreia aquosa, sangue e cálculo nas fezes, fezes brancas ao redor da cloaca, secreção pelo bico.	Coccidiose	Amprolium, Sulfadiazina, Sulfaquinolaxina ou Furoxona	1 a 2g/l (5 dias, parar 1 e repetir por mais 5 dias).
Diarreia branca, gosma no ninho, fezes endurecidas tampando o anus. Artrite nos joelhos.	Salmonelose ou Colibacilose	Cloranfenicol, Enrofloxacina ou Norfloxacina	1 gota no bebedouro de 50ml, durante 5 dias.
Patas inchadas, dedos ou articulação dos pés inflamados. Fica bicando a pata. Recolhe o pé constantemente. Feridas nas patas.	Estafilocose	Idem medicação acima e Pomada de Neomicina	Mesma posologia acima e uso local da pomada.
Espirra expelindo substâncias amareladas. Narinas obstruídas, bico aberto, piado rouco ou sem som, ofegante.	Corisa, Bromquite ou Traqueíte	Colírio de Cloranfenicol ou Gentamicina	Pingar uma gota em cada narina
Respiração difícil. Corpo e cauda balançam acompanhando ritmo da respiração. Mancha roxa na barriga, na base dos pulmões.	Aspergilose ou Micoplasmose	Lincomicina, Enrofloxacina, Tilosina ou Amoxicilina com Clavulanato de Potássio.	2 gotas no bebedouro de 50ml, durante 7 a 14 dias.
Ronqueira, chiados, respiração sibilante. Acesso asmático, tosse ou espirros com expectoração	Aero-saculite ou Doença Respiratória Crônica	Ivermectina (Pour on)	Pingar uma gota na pele da nuca. Suspender banho e verduras por 2 dias. Repetir somente após 28 dias, se necessário.

Não consegue partir sementes duras. Passa a língua (bico) nas grades como se estivesse limpando as mesmas. Limpa constantemente o bico no poleiro. Sementes ficam grudadas no bico ou na plumagem. *	Candidíase	Nistatina ou Cetoconazol	2 gotas no bebedouro de 50ml durante 7 dias
Pés com franjas esbranquiçadas na parte de baixo, lateral e ponta dos dedos.	Sarna (Ácaros)	a) Ivermectina (Pour on) b) Pomada de Helmerich a base de enxofre, Benzoato de Benzila ou Glicerina Fenicada	a) Pingar uma gota na pele da nuca, observando os cuidados acima, b) Passar nos pés 3 dias.
Pata inchada com ponto negro na parte inferior do dedo trazeiro (coxim plantar).	Pododermatite necrótica	a) Enrofloxacin b) Rilexine	a) 2 gotas no bebedouro de 50ml, por 15 dias; b) Aplicar na lesão. Não tentar extrair o ponto preto.
Sacudidas ao evacuar. Fezes amarelas ou esverdeadas. Ventre inchado e vermelho.	Enterite	Eliminar sementes gordurosas e ovo. Dar sulfato de ferro e chicória.	10 gramas p/ 250ml de água
Lesão no globo ocular do filhote que ainda não abriu os olhos, entre 3 a 8 dias de vida, com acúmulo de exsudato caseoso (puz).	Estafilocose	a) Pomada oftálmica de Cloranfenicol; b) Amoxicilina com clavulanato de potássio	a) Aplicar nos olhos diariamente b) Adicionar na papinha uma pitada. Não espremer, nem furar
Filhote de ninho com ponto preto na barriga.	Proventriculite	Amoxicilina com clavulanato de potássio	Adicionar uma pitada na papinha e dar no bico.