

Micoplasmose

União dos Criadores de Canários de Campinas - 2006

Por Kelly R. Crivellari

Responsável Técnica Vansil Laboratório Veterinário

Esta doença é causada por bactérias do género Mycoplasma também conhecida como Doença Crónica Respiratória. Acomete as aves de qualquer idade, sendo mais severa em aves jovens. A transmissão ocorre através aerossóis, ambiente, alimento, utensílios e da ave infectada que permanece portadora por vários meses, sendo portanto uma fonte disseminadora da doença. Os sintomas apresentados são tosse, espirros, secreção nasal, sinusite, aerossaculite, redução do consumo de alimento e conseqüentemente perda de peso. Medidas profiláticas como a eliminação das aves sintomáticas, desinfecção das instalações e utensílios devem ser adotadas. Neste caso o criador deverá administrar às sintomáticas Enro Flec 10% na proporção de 1 ml por litro de água de bebida durante 3 dias consecutivos. Se possível o criador deverá após o término do tratamento com antibiótico fornecer durante 5 dias consecutivos as aves tratadas Vitasil - Suplemento Vitamínico na proporção de 1 ml por litro de água de bebida.

PROVENTRICULITE OU "EMPACHAMENTO":

A proventiculite ou empachamento nada mais é que o acúmulo de alimento no inglúvio (formação de uma massa compactada) decorrente da redução do peristaltismo do órgão que acomete animais jovens e adultos. Se o inglúvio permanecer repleto por muito tempo, pode ocorrer a fermentação do alimento agravando o caso. Mudanças na dieta, ambiente, situações estressantes, fornecimento de alimentos frios, gordurosos, espessos e fibrosos contribuem para o aparecimento. O tratamento consiste na administração de soro fisiológico, óleo mineral tépido no inglúvio e retirada do conteúdo retido com uma sonda rígida ou flexível.